

Osnove matematične analize

Vaje 5

1. Izračunaj vsoto naslednjih geometrijskih vrst.

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10}{3^n}$

(b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n}{3^{2n-1}}$

(c) $3/2 + 1 + 2/3 + 4/9 + 8/27 + \dots$

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{3 \cdot 2^{3n-2}}$

(e) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^{3n}$, za tiste $x \in \mathbb{R}$, za katere vrsta konvergira.

Rešitve: (a) 5, (b) $\frac{4}{21}$, (c) $\frac{9}{2}$, (d) $-\frac{4}{15}$, (e) $\frac{x^3}{8-x^3}$.

2. Z uporabo korenskega, kvocientnega ali primerjalnega kriterija ugotovi, katere od spodnjih vrst kovergirajo in katere ne.

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$,

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(n+1)!}{(3n)!}$,

(e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 \cdot 2^{3n}}{n^4 + 1}$,

(g) $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{n!}$.

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{n^5 + 3}$,

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{4^n + 4}$,

(f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{\pi^n}$,

Rešitev: (a) kovergira (korenski ali kvocientni kriterij), (b) konvergira (primerjalni kriterij), (c) konvergira (kvocientni kriterij), (d) konvergira (primerjalni kriterij), (e) divergira (korenski kriterij), (f) divergira (kvocientni kriterij), (g) konvergira (kvocientni kriterij).

3. Za naslednje vrste ugotovi, če konvergirajo absolutno ali pogojno, ali divergirajo.

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{1 + \frac{1}{n}}$,

(b) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n \log n}$,

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n}}$.

Rešitev: (a) ne konvergira niti absolutno niti pogojno (členi ne gredo proti 0), (b) konvergira (Leibnizov kriterij), ni absolutno konvergentna (primerjalni kriterij), (c) konvergira (Leibnizov kriterij), ni absolutno konvergentna (primerjalni kriterij ali Raabejev kriterij).


4. Ugotovi, za katere x vrsta

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{2}{x}\right)^n$$

konvergira in izračunaj njeno vsoto.

Rešitev: Vrsta konvergira za $x \in (-\infty, -2) \cup (2, \infty)$. Vsota je $\frac{x}{x+2}$.

5. * Kochova snežinka je fraktal, ki ga dobimo z zaporedjem iteracij kot na spodnji sliki.




Recimo, da pri $n = 0$ začnemo z enakostraničnim trikotnikom s stranico a . Poišči geometrijski vrsti, ki določata ploščino in obseg Kochove snežinke. Seštej jih. Kolikšni sta ploščina in obseg izraženi z a ?

Rešitev: Ploščina je $\frac{2a^2\sqrt{3}}{5}$, obseg je neskončen.

6. * Dva vlaka na istem tiru potujeta eden proti drugemu s hitrostjo 100km/h. Supermuha zapusti prvi vlak s hitrostjo 150km/h, odleti proti drugemu, se v trenutku obrne in z enako hitrostjo spet odleti proti prvemu. Tam se spet obrne in odleti proti drugemu vlaku ... Ugotovi kolikšno razdaljo bo preletela Supermuha do trenutka, ko se vlaka zaletita. Na začetku sta bila vlaka oddaljena 200km.

Rešitev: Supermuha prepotuje razdaljo 150km.

7. Izračunaj obseg in ploščino preproge Sierpinskega.



Rešitev: Obseg je neskončen, ploščina pa 0.